



10 juli 2020

Akkerbouw – veehouderij – tuinbouwgroenten

### Alternaria en Phytophthora in aardappelen

Vanaf half juli zien we meestal de eerste aantasting van Alternaria ontstaan. Heeft u de eerste bespuiting tegen Alternaria nog niet uitgevoerd, voer dan vanaf nu elke week een bespuiting uit in Alternaria-gevoelige rassen. Start met Alternet of Narita en wissel dit af met Mancozeb. De ene week een bespuiting met 0,5 ltr/ha Alternet / Narita, de andere week een bespuiting met 1 – 1,5 kg. Mancozeb. Doe dit om resistentie te voorkomen en er daarmee voor te zorgen dat het middel Alternet / Narita ook in de toekomst nog zijn werking blijft behouden. Alternet / Narita mag maximaal 4 keer per seizoen toegepast worden en dient gespoten te worden met DRT 90%. Alternet / Narita is niet toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden.

Bescherm uw percelen goed tegen Phytophthora. Door de vochtige weersomstandigheden van de afgelopen weken is de kans op infectie groot. Zorvec is preventief een sterk middel. Zit er eenmaal phytophthora in het perceel dan kan 2 ltr/ha Proxanil toegevoegd worden aan de Zorvec voor een curatieve werking. Bij gebruik van Infinito: verhoog dan de dosering naar 1,6 ltr/ha en voeg 0,5 ltr/ha Cymbal Flow toe, of 0,2 kg/ha Curzate Partner. Infinito dient met DRT 90% toegepast te worden.

### MH in aardappelen

Door het wegvallen van Chloor IPC is de toepassing van MH in aardappelen noodzakelijk geworden voor een goede bewaring van het eindproduct. Een nevenvoordeel van MH is dat het zorgt voor minder aardappelopslag in het jaar erna. De dosering van MH is of 5 kg/ha Royal MH of 11 ltr/ha Itcan. Een goede toepassing is daarbij van groot belang. Zorg ervoor dat 80% van de gevormde knollen een minimale grootte hebben van 25 tot 30 mm doorsnede. Ook moet het gewas vitaal en goed aan de groei zijn, omdat het middel pas na drie weken volledig tot in de knol doorgedrongen is. Gebruik tijdens het toepassen 400 – 500 liter water per hectare. Spuit MH altijd apart en na de toepassing dient het minimaal 10 uur droog te zijn.

### Ziektebestrijding stamslabonen

Begin in stamslabonen te spuiten tegen Sclerotinia en Botrytis net vóór het witte knopstadium. Luna Privilege is het sterkste middel om mee te beginnen. De dosering is 0,5 ltr/ha. Voer deze toepassing uit met minimaal 300 – 400 ltr water/ha. Voeg 0,5 ltr/ha Mantrac Pro toe voor een betere bladkwaliteit. Als de eerste bloemblaadjes beginnen te vallen: de volgende bespuiting uitvoeren met 0,75 ltr/ha Safir + 0,5 ltr/ha Velocity of een andere uitvloeier.

## Ziektebestrijding suikerbieten

Momenteel is door het IRS in verschillende gebieden in het land een waarschuwing uitgegaan om uw percelen te controleren op bladschimmels. Is er een aantasting, voer dan een bespuiting uit met Retengo Plust. Heeft u nog Opus Team, dan mag dat dit jaar nog opgemaakt worden. Gebruik voor de tweede bespuiting Difuro Solo of Spyrale. Daarna kunt u Sphere of Bicanta inzetten. Zorg dat het interval niet te groot is. Met name tussen de eerste en de tweede bespuiting maakt de suikerbiet veel nieuw blad aan, dat niet te lang onbeschermd mag blijven.

Voeg bij de bespuiting 0,5 ltr/ha Velocity toe. Velocity is een uitvloeier en hechter ineen, die zorgt voor een betere verdeling op het blad, een betere indringing in het blad en een betere verdeling in het blad van de systemische fungiciden. Dit uit zich in een gezonder gewas, dat ook langer vitaal blijft.

Middel:	Dosering (ltr/ha):	Strobilurine:	Veiligheidstermijn:	DRT %
Retengo Plust	1	Ja	4 weken	75%
Sphere	(2x) 0,35	Ja	3 weken	75%
Opus Team *	(2x) 1	Nee	46 dagen	90%
Spyrale **	(2x) 1	Nee	4 weken	90% + 1 meter teeltvrije zone
Difuro Solo	(2x) 0,5	Nee	3 weken	75%
Bicanta	(2x) 1	Ja	5 weken	90%

\* De opgebruiktermijn van Opus Team is 31 oktober 2020, maar deze mag niet meer uitgeleverd worden.

\*\* Spyrale kan ook toegepast worden met DRT 95%-techniek in combinatie met 0,5 m teeltvrije zone.

## Korte tips:

- Vanaf heden beschikt Vlamings over het e-mailadres [bestellingen@vlamings.nl](mailto:bestellingen@vlamings.nl). Dit e-mailadres is gemaakt om alle schriftelijke bestellingen op één plek te ontvangen. Bestelt u graag per e-mail, dan willen wij u vragen om in het vervolg dit e-mailadres te gebruiken.
- Denk ná het oogsten van uw gewas aan het invullen van de gewasbeschermingsmonitor. Deze dient ingevuld te zijn binnen 2 maanden na de oogst van het gewas.
- De komende periode worden veel percelen ingezaaid met een groenbemester. Wanneer de groenbemester meetelt voor de GLB-vergroening, vergeet dan niet om direct na inzaai de juiste zaaidatum op 'Mijn RVO' in te vullen. Het invullen van de juiste zaaidatum is namelijk niet met terugwerkende kracht mogelijk.
- Om een keuze te maken voor de juiste groenbemester verwijzen we u naar de brochure "Groenbemers 2020" van eind juni 2020 of naar onze website. Uiteraard kunt u ook contact met uw teeltadviseur opnemen.

**Nick** van den Berkmortel 06 – 5340 2997

**Erik** van Gerwen 06 – 1247 5183

**Hein** Heeren 06 – 5397 8805

**Giel** van Rooij 06 – 2230 8288