AgroTips

15 juni 2021

Uienvlieg en trips in uien

Op een aantal percelen is de druk van uienvlieg hoog tot zeer hoog. Diegenen waar de uienvlieg bestreden wordt met de SIT methode hoeven geen extra bespuiting tegen de uienvlieg uit te voeren. Preventief een bespuiting uitvoeren met 0,75 L Benevia + 1-2 L Plantolie HF. Benevia werkt ook op trips. Dient gespoten te worden met DRT 95%.

We komen op dit moment zowel volwassenen als larven van de trips tegen in de winteruien, plantuien en vroege zaaiuien. Controleer uw percelen en voer indien nodig een bespuiting uit met 0,75 L/ha Batavia + 2 L/ha Plantolie HF. Dit is een systemisch middel, dat door de plant opgenomen moeten worden. Batavia werkt 2 – 3 weken. Gebruik 350 – 500 L/ha water voor een goede bedekking, maar laat deze middelen niet van de plant aflopen.

Bewaar de toepassing van middelen zoals Decis of Karate Zeon voor later in het seizoen, omdat deze ook de natuurlijke vijanden doden.

Middel	**Dosering (L/ha)**	**Aantal toepassingen**	**Minimum interval**	**Veiligheidstermijn**	**GWB**
Batavia	0,75	Max. 4 keer	7 dagen	7 dagen	JA
Benevia	0,75	Max. 2 keer	7 dagen	14 dagen	NEE

Indien u nog niet begonnen bent met de ziektebestrijding in uien, begin daar dan tijdig mee.

Phytophthora in aardappelen

De eerste bespuitingen voor phytophthora zijn inmiddels uitgevoerd. Op dit moment zitten de meeste aardappelen in de snelle loofgroeifase. De eerste bespuitingen kunt u uitvoeren met 0,6 L Revus + 0,25 – 0,5 L Mantrac. Daarna gaan we over op Zorvec. Dit middel beschermt nieuwe groei doordat het middel sterk opwaarts systemisch is. Het voordeel hiervan is dat nieuw blad beter beschermd wordt. Zorvec geeft een langere bescherming tegen phytophthora en daardoor kan het spuitinterval 3 dagen langer zijn dan bij andere producten. Dus bij een normaal spuitinterval van 7 dagen kan nu Zorvec gespoten worden met een interval van 10 dagen. Vanwege deze eigenschappen komt Zorvec het beste tot zijn recht in de snelle loofgroeifase.

Na 20 minuten is het middel regenvast. Dit biedt meer flexibiliteit en zekerheid wanneer het middel toegepast word in wisselvallige periodes.

Zorvec mag niet solo gespoten worden in verband met resistentie. Vandaar dat Zorvec is leverbaar met 2 verschillende aanvullende werkzame stoffen. Zorvec Ntec is gecombineerd met Gachinko (Canvas). De dosering is 0,15 L/ha Zorvec + 0,3 L/ha Gachinko. Zorvec Endavia is gecombineerd met benthiavalicarb, één van de werkzame stoffen uit de Valbon. De dosering is 0,4 L/ha. Zorvec dient als een blok van 3 toepassingen ingezet te worden. Het minimum interval bedraagt 7 dagen. Zet Zorvec alleen preventief in en niet als er al phytophthora in het gewas gevonden is. Zorvec met mancozeb is niet meer leverbaar, maar mag dit seizoen nog wel worden opgebruikt.

Coloradokever- en luisbestrijding in consumptieaardappelen

In diverse gewassen worden al volop luizen gevonden. Met name aardappeltopluizen en de groene perzikbladluis kunnen vanwege toprol en virus flinke schade aan de gewassen geven. Daarnaast worden in met name aardappelopslag, maar ook in vroege aardappelen, al coloradokevers gevonden. Voor een goede, brede werking op zowel luizen als de coloradokever kan het beste een bestrijding uitgevoerd worden met 0,25 kg/ha Gazelle. Voeg 0,5 L/ha Velocity toe voor een betere opname.

Open dag Innovatieveld Steenbergen

Op dinsdag 22 juni 2021 organiseren wij een open dag met de mogelijkheid om uw spuitlicentie te verlengen. Het thema is veiligheid & techniek. U dient zich aan te melden met de aanmeldstrook op de reeds door u ontvangen uitnodiging. Heeft u geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact op met uw teeltadviseur.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik het etiket. Op al onze producten en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

VLAMINGS
Prins Reinierstraat 7 | 4651 RZ Steenbergen | Tel. 0167-566 350
Nachtegaallaan 31 | 5425 RT De Mortel | Tel. 0492-319 434
www.vlamings.nl

Luizen in suikerbieten

Controleer uw suikerbieten regelmatig op luizen. Dit is eenvoudig te doen door in bijvoorbeeld een geer een tiental 'overbodige' planten uit te trekken en te controleren op luizen. Op verschillende percelen zijn groene perzikluizen en zwarte bonenluizen gevonden. Zit u over de schadedrempel, dan kunt u vanaf het 10 bladstadium 0,2 L/ha Closer of 0,45 L/ha Batavia + 1-2 L/ha Plantolie HF spuiten.

Onkruidbestrijding stamslabonen

Voer vanaf opkomst een bespuiting uit met 0,3 L/ha Basagran + 0,25 L/ha Webowett. Vanaf het eerste 3-blad stadium kan een bespuiting uitgevoerd worden met 0,5 – 1 L/ha Basagran + 0,25 L/ha Webowett óf 0,5 – 1,25 L/ha Corum + 0,25 L/ha Webowett. Bonen zijn erg dankbaar voor een bladbemesting met mangaan. Voeg 0,5 – 1 L/ha Mantrac toe.

Basagran mag maximaal 2x per seizoen toegepast worden, met een interval van 7 dagen. De maximale dosering is 2 L/ha per teelt. Corum mag maximaal 2x per seizoen toegepast worden, met een interval van 7 dagen. De maximum dosering 1,25 L/ha per teelt.

Bemesten aan de hand van plantsapanalyses

Nu de gewassen in volle groei staan, wordt het belangrijk om ervoor te zorgen dat de plant genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt. Een plantsapanalyse van NovaCropControl kan meer duidelijkheid geven. In een plantsapanalyse van NovaCropControl worden alle elementen geanalyseerd. De uitslag is binnen enkele dagen beschikbaar. Vraag uw teeltbegeleider voor meer informatie.

Help het gewas een handje met Total Care

Total Care is een complete bladmeststof ter ondersteuning van groei en bladkwaliteit. Total Care is zeer geschikt voor perioden van slechte opname vanuit de bodem. Het product bevat Aminosol, dat het gewas 'aan het infuus' legt. De plant krijgt direct aminozuren en behoeft deze niet zelf te maken uit o.a. stikstof. Daarnaast bevat Total Care een hoge dosering mangaan, magnesium en sporenelementen. Deze elementen zijn zeer belangrijk voor de bladkwaliteit en dienen daarom in een voldoende hoge dosering aanwezig te zijn.

Als het gewas niet wil groeien en/of bij slechte omstandigheden, voer dan een bespuiting uit met 5 – 10 L/ha Total Care. Indien nodig de toepassing herhalen.

Groene oplossingen in de praktijk

Voorkom problemen met wantsen in knolselderij

Een aantal chemische middelen zoals Calypso zijn niet meer toegestaan voor de bestrijding van wantsen en luizen in knolselderij. Een goedkope oplossing is daardoor komen te vervallen. De schade die wantsen in knolselderij kunnen aanrichten is enorm. Een aantasting leidt tot ernstige opbrengstderving en daarnaast zorgt het er in veel gevallen voor dat een deel van het gewas niet meer te oogsten is.

De biostimulanten van Pireco ondersteunen de plant bij de opbouw van een betere weerbaarheid bij abiotische stress én aantasting door ziekten en plagen. Het product Folisec is ontwikkeld om planten te ondersteunen bij de opbouw naar weerbaarheid bij de aanwezigheid van bovengrondse insecten zoals wantsen. In de praktijk zijn enkele toepassingen met 10 L Folisec + 1 L EVR met een interval van 7-10 dagen zeer effectief gebleken. Met name de sterke geur- en smaakstoffen in de Folisec zorgen ervoor dat wantsen geen eitjes willen afzetten in knolselderij.

Blauwmaanzaad vitaler met Vitalosol Gold

In de AgroTips van 25 mei 2021 schreven we al over de toepassing van Vitalosol Gold in graszaad. De afgelopen jaren hebben we al veel ervaring opgedaan met Vitalosol Gold in blauwmaanzaad. Het advies is om vanaf 20 – 30 cm gewashoogte enkele keren te spuiten met 3 L/ha Vitalosol Gold. Het gewas blijft daardoor beter aan de groei en heeft minder last van valse meeldauw.

Arjan de Feijter	06 – 5783 3663	**Jan** van Hassent	06 – 5364 9661	**Loek** Geluk	06 – 5121 7266
Lucien Laurijsse	06 – 5371 7537	**Marc** van der Bol	06 – 1052 0903	**Marijn** Nap	06 – 5175 4713

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik het etiket. Op al onze producten en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.