



15 maart 2019

Akkerbouw – veehouderij - tuinbouwgroenten

Bemesting wintertarwe en graszaad

Tijdens het mooie weer eind februari is op diverse percelen kunstmest gestrooid. Wanneer u dit nog niet gedaan heeft, en de omstandigheden laten het toe, adviseren wij een basisbemesting uit te voeren met 350 kg. KAS. Als uit uw grondmonsters blijkt dat de zwavelcijfers laag zijn kunt u beter 400 kg. KAS-zwavel (Sulfan) gebruiken. Ook wanneer u drijfmest wilt gaan gebruiken in de teelt van wintertarwe, adviseren wij u om de basisbemesting even hoog te houden. Op mangaan gevoelige percelen kan 0,75 – 1 l. Mantrac Pro mangaangebrek voorkomen.

Onkruidbestrijding en groeiregulatie in wintertarwe

Op de percelen waar in het najaar geen bodemherbiciden zijn gespoten, kan voor het sluiten van het gewas een onkruidbestrijding uitgevoerd worden met 0,2 l. Atlantis Star + 0,2 kg. Capri Twin + 1 l. olie 850. Als er geen onkruidgrassen te vinden zijn, kan de onkruidbestrijding ook met 2 l. MCPA + 1,5 l. Primstar of 1 l. Tapir. Voeg voor de bestrijding van ereprijs en paarse dovenetel 1,5 l. Fox 480 SC aan deze combinatie toe. Fox 480 SC toepassen met minimaal DRT 90%.

Vroege percelen wintertarwe zijn al weer toe aan de eerste groeiregulatie. Dit kan met 0,25 l. Trimaxx of Moddus + 0,5 l. CeCeCe. Toevoegen van 0,5 – 0,75 l. Mantrac heeft op mangaangevoelige gronden een positief effect op de opbrengst. Controleer voor de bespuiting op schimmelziekten zoals Septoria en gele roest. Voeg bij aantasting 1,5 l. Bravo Premium of 1,5 l. Ampera toe aan uw groeiregulatie. Bij een onkruidbestrijding met Atlantis Star + Capri Twin + olie 850 kan alleen CeCeCe worden gemengd, omdat Trimaxx of Moddus in combinatie met olie schade geeft aan het gewas. Apart spuiten is altijd beter.

Onkruidbestrijding plantuien

Na het planten van de uien kunt u een bespuiting uitvoeren met 1 - 1,5 l Stomp + 1 l Wing P + 0,2 l AZ 500 en 0,4 l Grounded. Vlak voor opkomst van de uien, is het aanwezige onkruid te bestrijden met 2 - 2,5 l. Klaverblad glyfosaat of 1 l. Reglone Bold. Stomp en Wing P moeten toegepast worden met DRT 90% doppen.

Onkruidbestrijding suikerbieten

Verwacht u kamille, spuit dan voor opkomst 2 kg. Pyramin of 2 l. Goltix SC. Op lichtere gronden kunt u beter Goltix SC toepassen. Pyramin mag maximaal 1 keer per 3 jaar worden toegepast met een maximum van 3 kg/ ha. Let hier op wanneer u uien in het bouwplan heeft.

Gaat u bieten zaaien, zorg er dan voor dat er alternatief voedsel ligt om muizenvraat te voorkomen. Blijf voedsel leggen totdat de bieten gekiemd zijn.

Tijdelijke vrijstelling Asulam

Het ministerie van LNV heeft een tijdelijke vrijstelling verleend voor het gebruik van Agrichem Asulam 2 in diverse teelten voor 2019. Voor spinazie productie onbedekt geldt een ingangsdatum van 26 april en een einddatum van 24 augustus. Agrichem Asulam 2 mag in spinazie productieteelt eenmalig voor opkomst maximaal 6 l/ha worden toegepast.

Let op: Agrichem Asulam 2 mag niet in grondwaterbeschermingsgebieden worden toegepast en moet bovendien worden toegepast met een spuittechniek uit tenminste de klasse DRT 97,5% of een overdekte beddenspuit.

Bemesting magnesium, zwavel en calcium

De laatste jaren zien we zowel op de grondmonsters als in het veld tekorten van magnesium, zwavel en calcium ontstaan. Het is daarom verstandig om, aan de hand van uw grondmonster, een bemesting uit te voeren met kieseriet, patentkali of calciumsulfaat.

Efficiënte bemesting van aardappelen, uien of mais met o.a. Physiostart

De lagere fosfaatnormen dwingen ons na te denken over efficiëntere fosfaatbemesting. Zeker als we ook voor structuurverbetering organische stof willen aanvoeren, komt de bemesting van de gewassen in het gedrang. Door te bemesten met meststoffen zoals microgranulaten of vloeibare meststoffen in de rij, is een goede opbrengst en kwaliteit te handhaven en blijft er ruimte over om organisch materiaal, zoals compost, aan te voeren. Met uw teeltvoorlichter kunt u hierover eens van gedachten wisselen.

Physiostart is een microgranulaat dat bestaat uit stikstof, fosfaat, kali, zink, zwavel, kalk en biostimulanten zoals humine- en fulvinezuren. De startfosfaat en zink zijn direct opneembaar vanaf het begin van de wortelontwikkeling. Physiostart stimuleert de verdere wortelontwikkeling om zo meer wortelvolumen, vertakkingen en meer haarwortels te produceren. Dit om meer voedingsstoffen zoals fosfaat uit de grond te kunnen opnemen zodat een goede beginontwikkeling gewaarborgd is.

Ingetrokken toelatingen

Pyramin

De toelating van Pyramin is komen te vervallen. De verkooptermijn is 30 juni 2019 en de opgebruiktermijn is 30 juni 2020.

Legurame

Legurame mag opgebruikt worden tot 3 februari 2020.

Reglone en andere diquat-bevattende middelen

De toelating van o.a. Reglone en Reglone Bold is eindig. Deze producten mogen verkocht en opgebruikt worden tot 4 november 2019. De opgebruiktermijn van Reglone Bold en Mission 200 SL is 4 februari 2020

Mocap

Waarschijnlijk is 2019 het laatste jaar dat Mocap verkocht en opgebruikt mag worden.

Wijzigingen in de mestwetgeving

Vanaf dit jaar zijn er enkele wijzigingen in de mestwetgeving.

Extra aanvoer fosfaat: Teelt u suikerbieten, consumptieaardappelrassen, wintertarwe, zomergerst, pootaardappelen, zaai-ui of maïs en valt uw perceel in de fosfaat klasse neutraal of laag, dan mag u (bij heel hoge opbrengsten) meer fosfaat aanvoeren.

Fosfaattoestand Neutraal: 5, 10 of 15 kg. fosfaat extra (afhankelijk van de opbrengst)

Fosfaattoestand Laag: 5 kg.

Let op! Aan deze regelen zitten belangrijke maatregelen gebonden. Voor de volledige regelgeving kijk op de website van RVO bij de Equivalente maatregelen.

2. Bij de teelt van snijmais moet op zand- of lössgrond uiterlijk op 1 oktober een vorstbestendig vanggewas ingezaaid worden. Dit kan in de vorm van grasonderzaai in de hoofdteelt of door zaai van een vanggewas na de oogst, maar voor 1 oktober. Lees meer hierover in onze Agrotip veehouderij.

Korte tips

- Controleer voor het seizoen of u spuitdoppen voldoen aan deze eisen!! Dit is te vinden op de website van [helpdeskwater](http://www.helpdeskwater.nl).
- **www.helpdeskwater.nl → Emissiebeheer → Agrarisch → Open teelt → Driftreducerende spuittechnieken**
- Dual Gold en Gardo Gold mogen vanaf komend seizoen niet meer gebruikt worden op zandgronden en in grondwaterbeschermingsgebieden.

Arjan de Feijter 06 – 5783 3663 **Jan van Hassent** 06 – 5364 9661 **Loek Geluk** 06 – 5121 7266
Lucien Laurijsse 06 – 5371 7537 **Marc van der Bol** 06 – 1052 0903 **Marijn Nap** 06 – 5175 4713