



3 april 2019

Akkerbouw – veehouderij – tuinbouwgroenten

Groeiregulatie en ziektebestrijding wintertarwe

De vroegste percelen wintertarwe zijn al weer toe aan hun tweede groeiregulatie. Dit stadium, de 2^{de} knoop voelbaar, is bereikt als het gewas tot de bovenkant van uw laars komt. Deze groeiregulatie kan worden uitgevoerd met 0,5 l. CeCeCe + 0,25 l. Trimaxx. Voor een goede ziektebestrijding tegen Septoria, gele- en- bruine roest voegt u 0,75 l. Seguris toe. Op mangan-gevoelig gronden kunt u daar nog 0,75 l. Mantrac Pro aan toevoegen. Seguris dient toegepast te worden met DRT 90%.

Bemesting magnesium en zwavel

We komen in een aantal percelen granen tekorten van magnesium en zwavel tegen. Het is daarom verstandig, aan de hand van uw grondmonster het gebrek te corrigeren met bijv. kieseriet, sulfan of patentkali.

Onkruidbestrijding zaaiuien

Direct na het zaaien van de uien of wanneer deze gekiemd zijn, kunt u een bespuiting uitvoeren met 0,75 – 1,25 l. Stomp + 0,4 l. Grounded. De middelen Wing-P, AZ-500, Pyramin DF en Dual Gold zijn niet toegelaten voor opkomst van het gewas. Vlak voor opkomst van de uien, is het aanwezige onkruid te bestrijden met 2 – 2,5 l. Klaverblad glyfosaat of 1,5 l. Reglone Bold. Stomp dient toegepast te worden met DRT 90%.

Wanneer u gebruik wilt maken van het middel AZ 500, dan kan dit pas vanaf 100% opkomst. AZ 500 werkt tegen alle breedbladige onkruiden, zoals kamille, klein kruiskruid en meldesoorten. De dosering is 0,2 l. en het middel heeft vocht nodig voor een goede werking.

Onkruidbestrijding plantuien

Wanneer de plantuien boven staan en de grond vochtig is kan er een bespuiting uitgevoerd worden met 0,75 – 1 l. Chloor IPC + 0,5 – 0,75 l. Stomp + 1 l. Wing-P of 0,5 kg. Pyramin DF. Stomp op lichte grond aanvullen tot 2,5 l. en op zware grond tot 3,25 l. Pyramin DF aanvullen tot 2 kg. Wing-P maximaal 4 l. gebruiken. Stomp en Wing-P dienen toegepast worden met DRT 90%. Let op met Chloor in de buurt van bloeiende gewassen.

Onder afgeharde omstandigheden kan 0,25 – 0,5 kg. Lentagran + 0,2 – 0,5 l. Bromotril + 0,12 – 0,18 l. Starane Top gespoten worden. Zorg er wel voor dat er een waslaag op de plant zit. Met name de bestrijding van veelknoppigen wordt door de toevoeging van Starane Top veel makkelijker. In totaal mag Lentagran 4 keer 0,25 – 0,5 kg. worden toegepast met een interval van 5 dagen. Bij Bromotril is dat 3 keer 0,25 – 0,5 l, met een totaal van 1 l. per hectare en een interval van 7 dagen. In totaal mag 0,3 l. Starane Top gespoten worden, verdeeld over 2 bespuitingen, met een interval van 14 dagen. Starane Top moet toegepast worden met DRT 90%.

Muizenvraat suikerbieten

Heeft u de bieten gezaaid, zorg er dan voor dat er alternatief voedsel ligt om muizenvraat te voorkomen. Blijf voedsel leggen totdat de bieten gekiemd zijn. Wij kunnen u helpen aan niet-ontsmette voertarwe.

Insecten in suikerbieten

Door het verdwijnen van de neonicotinoïden als zaaizaadcoating is de kans aanwezig dat uw suikerbietengewas wordt aangetast door diverse plagen. Controleer regelmatig uw percelen of de groei er nog in zit, fris oogt en glimt in de zon. Ziet u iets bijzonders, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Onkruidbestrijding suikerbieten

Verwacht u kamille, spuit dan voor opkomst 2 kg. Pyramin of 2 l. Goltix + 0,4 l. Grounded. Op zand of zavel kunt u beter kiezen voor 2 l. Goltix en kleigrond 2 kg. Pyramin. Pyramin mag maximaal 1 keer per 3 jaar worden toegepast met een maximum van 3 kg/ha. Let hier op wanneer u uien in het bouwplan heeft. Dit is het laatste seizoen dat Pyramin verkocht mag worden. De aflevertermijn is 30 juni 2019 en de opgebruiktermijn is 30 juni 2020.

Vanaf opkomst kunt u een bespuiting met 0,75 l. Betanal Maxxpro + 0,5 l. Goltix SC / Pyramin DF óf 0,5 l. BOGT uitvoeren. Wanneer de suikerbietenplantjes 2 echte blaadjes gaan vormen, kunt u de dosering gaan verhogen. Vanaf het 2-blad stadium kan gespoten worden met 1,25 l. Betanal Maxxpro + 1 l. Goltix SC / Pyramin DF óf 1 l. van de losse componenten. Wanneer varkensgras en andere veelknopigen voor komen op het perceel, dan kunt u 0,25 l. Lontrel of 15 – 30 g. Safari toevoegen.

Voor de bestrijding van aardappelopslag dient in een later stadium Lontrel aan de mix toegevoegd te worden. Lontrel mag maximaal 3 keer per seizoen toegepast worden, met een maximum van 1,5 l. per hectare. Het toevoegen van Dual Gold of Frontier verstrekt de combinatie en zorgt ervoor dat er geen nieuw onkruid meer kiemt. Dual Gold mag niet meer op zandgrond worden toegepast.

Bijsturen aan de hand van plantsapmetingen

Gedurende het teeltseizoen is het mogelijk om aan de hand van plantsapmetingen uw gewas bij te sturen. Te denken valt aan bijbemesting van magnesium, calcium, borium, mangaan, etc in bijvoorbeeld aardappelen, uien en knolselderij. Bestel de materialen op tijd voor het seizoen.

Onkruidbestrijding witlof en cichorei

Als u veel melden verwacht is het raadzaam om 8 l. Bonalan in te werken. De beste manier is om de Bonalan tijdens het klaarrijden van het perceel in één werkgang toe te passen. Is dit niet mogelijk, zorg er dan voor dat de Bonalan zo kort mogelijk wordt blootgesteld aan het uv-licht. Het middel breekt namelijk snel af door uv-licht. Bonalan dient in de eerste 14 meter naast de sloot toegepast te worden met DRT 95. Voor de rest van het perceel geldt DRT 75. Na het zaaien kunt 2,5 l. Setanta Flo (Kerb Flo) + 0,4 l. Grounded als bodemherbicide toepassen.

AZ 500 is ook toegelaten in cichorei en witlof, ook hiervoor geldt: pas toepassen wanneer alle planten boven staan én de grond vochtig is.

Laat ons uw perceel volgen via CropVision

Wij beschikken over het softwareprogramma CropVision Consultant. Via dit programma kunnen onze adviseurs meekijken in uw teeltregistratie en digitaal een advies uitbrengen. Wanneer bijvoorbeeld onze adviseur in uw perceel staat, kan hij zelf in uw teeltregistratie opzoeken wanneer welke bespuiting of bemesting uitgevoerd is. Aan de hand daarvan kan hij direct een volgend bemestings- of bespuitingsadvies maken en naar u doorsturen. Uiteraard zult u als klant eerst een machtiging aan de organisatie “Vlamings” dienen te geven. Pas daarna kan onze adviseur in uw teeltregistratie meekijken. Voor meer informatie hierover kunt u bij onze adviseurs terecht.

Korte tips:

- De open dag op ons Innovatieveld in Steenberghe is gepland op dinsdag **25 juni 2019**. De uitnodiging volgt te zijner tijd.
- Vanaf 15 april bent u verplicht uw aardappelafvalhopen af te dekken en haarden te bestrijden. Een aangetaste afvalhoop kan honderden hectares aardappelen met Phytophthora besmetten. We zien nog veel aardappelafvalhopen onbedekt liggen. Uw aardappelafvalhoop doodspuiten is niet voldoende. Neem uw verantwoordelijkheid.
- Grounded is een hechter voor toevoeging aan bodemherbiciden en houdt de herbiciden langer in de toplaag van de bodem. Dit resulteert in een betere (duur)werking van de bodemherbicide en minder uitspoeling naar het oppervlaktewater.

Arjan de Feijter 06 – 5783 3663 **Jan** van Hassent 06 – 5364 9661 **Loek** Geluk 06 – 5121 7266
Lucien Laurijsse 06 – 5371 7537 **Marc** van der Bol 06 – 1052 0903 **Marijn** Nap 06 – 5175 4713