



24 april 2019

Akkerbouw – veehouderij – tuinbouwgroenten

Bodemherbiciden aardappelen

Als na het frezen de bedden bezakt zijn kunt u de bodemherbiciden toepassen. Op schone grond kunt u een bespuiting uitvoeren met 0,5 – 0,75 l. Sencor Vlb + 3 – 4 l. Boxer, of 0,5 – 0,75 l. Sencor Vlb + 2 l. Proman. Als u veel melden verwacht is het verstandig om 1,5 l. Challenge toe te voegen. Let bij Sencor wel op rasbeperkingen. Deze lijst kunt u terug vinden in ons gewasbeschermingsboek op bladzijde 10 of in de Sencor app.

Verwacht u veel onkruid, dan geeft het combineren van meerdere werkzame stoffen een betere onkruidbestrijding. Melden, kleefkruid, perzikkruid en zwaluwtong zijn de onkruiden die de meeste problemen geven in deze teelt. Zie onderstaande tabel voor de werking van de middelen op de probleem onkruiden.

Onkruiden	Middel
Kleefkruid	Boxer
Melden	Challenge of Proman
Perzikkruid	Sencor
Varkensgras	Centium
Zwaluwtong	Centium

Een brede combinatie is 0,15 l. Centium + 1,5 l. Proman + 3 l. Arcade. Arcade kunt u ook vervangen door 0,4 l. Sencor + 3 l. Boxer. Door deze combinatie te spuiten worden de meest voorkomende onkruiden bestreden en kan ook gespoten worden in de sencorgevoelige rassen (behalve in Frieslanders). Verwacht u veel meldesoorten dan is de toepassing van 3 l. Arcade + 0,15 l. Centium + 1,5 l. Challenge een mogelijkheid. Voeg voor een betere en langere werking 0,4 l. Grounded toe. Boxer, Arcade en Challenge dienen toegepast te worden met DRT 90%.

Onkruidbestrijding zaaiuien na opkomst

Verschillende percelen zaaiuien hebben last van tweewassigheid. Daarbij staan planten in het vlagblad-stadium en komen sommige planten net boven. Dit bemoeilijkt de onkruidbestrijding, omdat over een té lange tijd geen contactherbicide-bespuiting uitgevoerd kan worden. Indien door de regen de grond voldoende vochtig is, kunt u wel een bespuiting uitvoeren met 0,5 l. Chloor IPC. Let op met Chloor IPC in de buurt van bloeiende gewassen.

AZ 500 is een breed werkende bodemherbicide tegen alle breedbladige onkruiden, zoals kamille, klein kruiskruid en meldesoorten. Dit middel dient gespoten worden vanaf 100% opkomst en kan toegevoegd worden aan de bovengenoemde bespuitingen in een dosering van 0,2 l.

Als je bij de kleinste plantjes het eerste pijpje boven de grond ziet kan onder afgeharde omstandigheden een bespuiting met 0,25 – 0,5 kg. Lentagran + 0,15 l. Bromotril + 0,12 l. Starane Top uitgevoerd worden. Zorg er wel voor dat er een waslaag op de plant zit. Met name de bestrijding van veelknopigen wordt door de toevoeging van Starane Top veel makkelijker. In totaal mag Lentagran 4 keer 0,25 – 0,5 kg. worden toegepast met een interval van 5 dagen. Bij Bromotril is dat 3 keer 0,25 – 0,5 l, met een totaal van 1 l. per hectare en een interval van 7 dagen. In totaal mag 0,3 l. Starane Top gespoten worden, verdeeld over 2 bespuitingen, met een interval van 14 dagen. Starane Top dient toegepast te worden met DRT 90%.

Wanneer de grond vochtig is, kan vanaf het 1e pijpje net zichtbaar een bespuiting worden uitgevoerd met 0,5 – 1 l. Chloor IPC + 1 l. Wing P, eventueel aangevuld met 0,5 kg. Pyramin. Pyramin op lichte grond aanvullen tot 1,5 kg. en op zware grond tot 2 kg. Dit in maximaal 3 keer toepassen. Wing P mag na opkomst 2 keer worden toegepast met een dosering van 1 – 2 l. Stomp en Wing P dienen toegepast te worden met DRT 90%.

Onkruidbestrijding en bladvoeding plantuinen

De bodemherbiciden in de plantuinen hebben dit jaar goed hun werk gedaan. Het wordt nu tijd om deze herbiciden aan te vullen tot het maximum. Vul de stomp aan tot 2 l. en de Wing-P op lichte grond tot 2 l. en op zware grond tot 3 l. Stomp en Wing-P dienen beide met DRT 90% gespoten te worden. De maximale dosering van AZ 500 is 0,2 l.

Om uw plantuinen gezond te houden en de groei te versnellen, kunt u ze een handje helpen met bladvoeding. Dit doet u door wekelijks 2,5 – 3 l. Total Care + 0,5 l. Mantrac + 1,5 l. Hydromag te spuiten. Vanaf de bolling voegt u 3 l. Total Care + 5 l. Kali TS. toe aan de ziektebestijding. Bij mangaangebrek vallen de pijpen alle kanten op. Magnesiumgebrek uit zich in een vaal gewas. Bij snelle bladontwikkeling en bij droogte is de kans op deze gebreken erg groot.

Onkruidbestrijding suikerbieten

Vanaf opkomst kunt u een bespuiting met 0,75 l. Betanal Maxxpro + 0,5 l. Goltix SC óf 0,5 l. BOGT uitvoeren. Wanneer de suikerbietenplantjes 2 echte blaadjes gaan vormen, kunt u de dosering gaan verhogen. Vanaf het 2-blad stadium kan gespoten worden met 1,25 l. Betanal Maxxpro + 1 l. Goltix SC óf 1 l. van de losse componenten. Wanneer varkensgras en andere veelknopigen voor komen op het perceel, dan kunt u 0,25 l. Lontrel of 15 – 30 gr. Safari toevoegen.

Heeft u tweewassigheid in uw perceel suikerbieten, wacht dan niet het bestrijden van aanwezige onkruiden. Doordat u de onkruiden in een klein stadium bestrijdt, kunt u later bij het opkomen van de tweede zending suikerbieten ook een bespuiting uitvoeren met een lage dosering.

Onkruidbestrijding witlof en cichorei

De eerste cichorei staat boven de grond. Onkruiden zoals kamille, klein kruiskruid, melde en witte krodde komen tevoorschijn. Controleer uw percelen en spuit als het nodig is met 5 – 8 gram Safari, gecombineerd met minimaal 0,5 l. Aminosol. Als de grond vochtig is kan dit gemengd worden met 0,5 l. Chloor IPC en 0,25 l. Setanta Flo/ Kerb Flo. Als de echte blaadjes van het gewas verschijnen kan ter versterking van het geheel 0,5 l. Legurame en voor elk echte blaadje 0,1 l. Dual Gold of Frontier Optima worden toegevoegd. Let op!! Dual Gold mag niet meer op zandgrond worden toegepast. Legurame mag maximaal 2 keer per teeltcyclus worden toegepast met een interval van 14 dagen. Safari mag 4 keer per teeltcyclus worden toegepast met een tussentijd van 7 dagen, een totale hoeveelheid van 120 gram per hectare. Dual Gold dient gespoten te worden met DRT 90%.

Vanaf 100% opkomst kan AZ 500 toegepast worden aan bovenstaande bespuitingen. Dit middel werkt tegen alle breedbladige onkruiden, zoals kamille, klein kruiskruid en meldesoorten. De eerste keer kan 30 ml. toegevoegd worden aan de mix. Daarna 70 ml. en de laatste keer 100 ml. toevoegen aan de mix.

Vlamings waarschuwings-WhatsApp

Vanaf dit seizoen willen wij starten met een waarschuwings-WhatsApp voor de gewassen aardappelen en uien. U kunt uzelf aanmelden voor deze WhatsApp service. U ontvangt dan enkele keren per seizoen een berichtje wanneer iets bijzonders in de teelt gaande is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om, in het geval van uien, de eerste gevonden meeldauw of trips. U kunt uzelf aanmelden door “Aardappelen AAN” en/ of “Uien AAN” te appen naar het nummer: 0167 566 350. U ontvangt dan persoonlijk een appje van de “Vlamings-telefoon”. Het is geen WhatsApp groep.

Korte tips:

- De open dag op ons Innovatieveld in Steenberg is gepland op dinsdag **25 juni 2019**. De uitnodiging volgt te zijner tijd.
- Let op!!! Dual Gold mag niet meer toegepast worden op zandgrond.
- Grounded is een hechter voor toevoeging aan bodemherbiciden en houdt de herbiciden langer in de toplaag van de bodem. Dit resulteert in een betere (duur)werking van de bodemherbicide en minder uitspoeling naar het oppervlaktewater.
- Vanaf 15 april bent u verplicht uw aardappelafvalhopen af te dekken en haarden te bestrijden.

Arjan de Feijter 06 – 5783 3663 **Jan van Hassent** 06 – 5364 9661 **Loek Geluk** 06 – 5121 7266
Lucien Laurijsse 06 – 5371 7537 **Marc van der Bol** 06 – 1052 0903 **Marijn Nap** 06 – 5175 4713