



5 augustus 2019

Akkerbouw – veehouderij – tuinbouwgroenten

MH in aardappelen

Het toepassen van 5 kg/ha Royal MH of 11 L/ha Itcan kan goede resultaten geven bij de bewaring van het eindproduct en tegen aardappel-opslag in het veld. Een goede toepassing is daarbij van groot belang. Zorg er voor dat 80% van de gevormde knollen een minimale grootte hebben van 25 tot 30 mm doorsnede. Ook moet het gewas vitaal en goed aan de groei zijn, omdat het middel pas na drie weken volledig tot in de knol doorgedrongen is. Gebruik tijdens het toepassen 400 – 500 liter water per hectare. Spuit MH altijd apart en na de toepassing dient het minimaal 10 uur droog te zijn.

Ziektebestrijding suikerbieten

De meeste percelen suikerbieten zijn ongeveer 3 weken geleden voor de eerste keer gespoten tegen bladschimmels. Deze middelen zijn nu uitgewerkt. Daarom is het verstandig om komende week een tweede bespuiting tegen bladschimmels toe te passen. Daarnaast is het laatst aangemaakte blad nog onbeschermd tegen schimmels.

Welk middel u nu het beste kunt gebruiken is afhankelijk van het middel wat u al toegepast heeft en de rooidatum. Voeg bij de bespuiting 0,5 L/ha Velocity. Velocity is een uitvloeier en hechter ineen die zorgt voor een betere verdeling op het blad, een betere indringing in het blad en een betere verdeling in het blad van de systemische fungiciden. Dit uit zich in een gezonder gewas, dat ook langer vitaal blijft.

Middel:	Dosering (ltr/ha):	Strobilurine:	Veiligheidstermijn:	DRT %
Retengo Plust	1	Ja	4 weken	75%
Sphere	(2X) 0,35	Ja	3 weken	75%
Opus Team	(2x) 1	Nee	46 dagen	90%
Spyrale	(2x) 1	Nee	4 weken	95%
Difure Pro	(2x) 0,6	Nee	3 weken	75%

Het uitverkoop termijn van Difure Pro was 31 juli 2019 en het opgebruiktermijn is 19 maart 2020. Het uitverkoop termijn van Opus Team is 31 oktober 2019 en het opgebruiktermijn is 31 oktober 2020.

Gebruik van GBM in GLB-groenbemesters

De regels omtrent het gebruik van GBM in groenbemesters die gelden voor de GLB zijn sinds vorig jaar veranderd.

Zo mag er geen onkruid-bespuiting meer worden uitgevoerd tussen de oogst van het hoofdgewas en het inzaaien van de groenbemester. Ook tijdens de 8 weken daarop, mag geen GBM gebruikt worden.

Het is nu wel toegestaan om ná die 8 weken een bespuiting in de groenbemester uit te voeren. Dit kan met middelen als Klaverblad Glyfosaat, Primstar en Primus. Primstar dient, bij een dosering hoger dan 1,6 L/ha, gespoten te worden met DRT 95%.

Wortelonkruidbestrijding op braakland

Heeft u percelen waar de oogst al van af is en waar geen GLB-groenbemester op komt, maak dan van dit moment gebruik om de wortelonkruiden te bestrijden. De combinatie van 4 L/ha Klaverblad-Glyfosaat, 1 L/ha olie en 2 L/ha 2,4-D Amine heeft een brede werking. Spuit de genoemde tankmenging zo snel mogelijk na het vullen van de spuit om te voorkomen dat deze middelen met elkaar gaan reageren en het resultaat negatief wordt beïnvloed. Let op bij het gebruik van groeistoffen, deze kunnen negatieve gevolgen hebben op de kieming van het volggewas zoals groenbemesters, bonen of spinazie.

Ziektebestrijding in stamslabonen

Begin in stamslabonen te spuiten tegen Sclerotinia en Botrytis net voor het witte knopstadium. Luna Privilege is het sterkste middel om mee te beginnen. De dosering is 0,5 L/ha. Voeg 0,5 L/ha Mantrac Pro toe voor een betere bladkwaliteit. Als de eerste bloemblaadjes beginnen te vallen de volgende bespuiting uitvoeren met 0,75 L/ha Safir + 0,5 L/ha Velocity of een andere uitvloeier.

Uitrijperiode drijfmest

Het uitrijden van drijfmest op bouwland is toegestaan van 1 februari tot 1 augustus. Langer uitrijden tot 15 september is toegestaan als uiterlijk 31 augustus van dit jaar een groenbemester wordt geteeld of in het najaar bloembollen worden geplant. Het uitrijden van drijfmest op grasland mag van 16 februari tot 1 september.

Stikstofkunstmest mag van 1 februari tot en met 15 september gebruikt worden op gras- en bouwland.

	<i>Drijfmest</i>	<i>Stikstofkunstmest</i>	<i>Vaste mest zand</i>	<i>Vast mest klei</i>
Grasland	Tot 1 september	Tot 15 september	Tot 1 september	Tot 15 september
Bouwland	Tot 1 augustus	Tot 15 september	Tot 1 september	Tot 31 december
Bouwland met groenbemester of bloembollen (najaar)	Tot 15 september	Tot 15 september	Tot 1 september	Tot 31 december

Wantsen in knolselderij

We komen nu weer wantsen tegen in de knolselderij. Controleer uw percelen en voer zo nodig een bespuiting uit met 0,25 L/ha Calypso of 50 ml. Karate Zeon en 50 ml/ha Tripsflow. Zo nodig deze bespuiting herhalen. Calypso dient met DRT 90% gespoten te worden.

Korte tips:

- Denk na het oogsten van uw gewas aan het invullen van de gewasbeschermingsmonitor. Deze dient ingevuld te zijn binnen 2 maanden na de oogst van het gewas.
- De komende weken worden veel percelen ingezaaid met een groenbemester. Wanneer de groenbemester meetelt voor de GLB-vergroening, vergeet dan niet om direct na inzaai de juiste zaaidatum op 'Mijn RVO' in te vullen. Het invullen van de juiste zaaidatum is namelijk niet met terugwerkende kracht mogelijk.
- Om een keuze te maken voor de juiste groenbemester verwijzen we naar de Brochure groenbemesters 2019 van begin juli 2019 of naar onze website.
- Door Europees besluit is de toelating van de actieve stof chloorprofam niet verlengt. De aflevertermijn van chloorbevattende kiemremmers is 8 juli 2020 en het opgebruik termijn is 8 oktober 2020. Misschien geeft het komende bewaar seizoen mogelijkheden om te testen met alternatieven.

Arjan de Feijter 06 – 5783 3663 **Jan** van Hassent 06 – 5364 9661 **Loek** Geluk 06 – 5121 7266
Lucien Laurijsse 06 – 5371 7537 **Marc** van der Bol 06 – 1052 0903 **Marijn** Nap 06 – 5175 4713