



Mei 2020

Spuitschema ziektebestrijding zaaiuien

1^{ste} bespuiting:

- 2,5 kg/ha Mancozeb (Fythane) + 50 ml/ha Tripsflow

2^{de} bespuiting:

- 2,5 kg/ha Mancozeb (Dithane) + 50 ml/ha Tripsflow

3^{de} bespuiting:

- 2,0 kg/ha Mancozeb (Fythane) + 1 L/ha Fandango + 50 ml/ha Tripsflow

4^{de} bespuiting:

- 2,5 kg/ha Mancozeb (Dithane) + 0,5 L/ha Luna Experience + 50 ml/ha Tripsflow

5^{de} bespuiting:

- 2,0 kg/ha Mancozeb (Fythane) + 1 L/ha Fandango + 50 ml/ha Tripsflow

6^{de} bespuiting

- 2,5 kg/ha Mancozeb (Dithane) + 0,5 L/ha Luna Experience + 50 ml/ha Tripsflow

7^{de} bespuiting:

- 2,5 kg/ha Mancozeb (Fythane) + 1,5 L/ha Scala + 50 ml/ha Tripsflow

8^{ste} bespuiting:

- 2,5 kg/ha Mancozeb (Dithane) + 1,5 L/ha Scala + 50 ml/ha Tripsflow

Bij hoge meeldauwdruk Mancozeb vervangen door 2 kg/ha Fubol Gold of Valbon. Bij dreiging van koprot 1,5 kg/ha Signum toevoegen.

Het is mogelijk de Dithane / Fythane te vervangen door Mastana SC of Penncozeb SC. Let wel op, de dosering hiervan is 4 L/ha.

Om uw uien gezond te houden en de groei te versnellen, kunt u ze een handje helpen met bladvoeding. Dit doet u door wekelijks **2,5 – 3 L/ha Total Care + 0,5 L/ha Mantrac + 1,5 L/ha Hydromag** te spuiten. Vanaf de bolling voegt u **3 L/ha Total Care + 5 L/ha Kali TS** toe aan de ziektebestijding. Bij mangaangebrek vallen de pijpen alle kanten op. Magnesiumgebrek uit zich in een vaal gewas. Bij snelle bladontwikkeling en bij droogte is de kans op deze gebreken erg groot.

Spuitschema ziektebestrijding uien

Middel	Toepas. BBCH	Dosering (kg / L per ha)		Max. aant. keer	Min. Interval	VT	GWB*
		Per keer	Totaal				
Acrobat DF	Voor 40	2,5	10	4	12 – 14	14	Ja
	Na 40				7 – 14		
Dithane DG Newtec/ Fythane DG	Voor 40	2,5	10	4	14	28	Ja
	Na 40				7-10		
Fandango	Na 40	1 - 1,25	5	4	5 – 10	14	Ja
Fubol Gold	Voor 40	2	6	3	10	28	Ja
	Na 40				7		
Luna Experience	-	0,5	1	2	7	7	Nee
Penncozeb SC	Voor 40	4	-	-	14	28	Ja
	Na 40				7-10		
Tridex	-	2	10	5	10	28	Ja
Scala	-	2	4	2	10	14	Ja
Signum	-	1,5	3	2	7 - 10	21	Ja
Valbon	Voor 40	2	12	6	14	28	Ja
	Na 40				7		

*grondwaterbeschermingsgebied

Opmerkingen:

- Fandango heeft een nevenwerking op Stemphylium.
- Signum en Fandango hebben een nevenwerking op koprot.
- Fandango na 3 opeenvolgende Fandango-behandelingen in uien afwisselen met een middel met een ander werkingsmechanisme.
- Per teelt mag maar maximaal 3 keer een gewasbehandeling worden uitgevoerd met een metalaxil bevattend middel, zoals Fubol Gold.
- Valbon toepassen in maximaal 2 blokken van 3 bespuitingen, tussen de blokken een interval aanhouden van minimaal 30 dagen.
- De toelating van Olympus komt te vervallen. Het aflevertermijn is 1 juli 2019 en het opgebruiktermijn is 1 juli 2020.
- Onlangs zijn de producten Zorvec Endavia en Orondis Plus toegelaten voor de bestrijding van valse meeldauw in uien. De beschikbaarheid is momenteel zeer beperkt, we verwachten dit product volgend seizoen in te kunnen zetten.

Arjan de Feijter 06 – 5783 3663 **Jan van Hassent** 06 – 5364 9661 **Loek Geluk** 06 – 5121 7266
Lucien Laurijsse 06 – 5371 7537 **Marc van der Bol** 06 – 1052 0903 **Marijn Nap** 06 – 5175 4713