



20 mei 2020

Akkerbouw – veehouderij – tuinbouwgroenten

Wortelonkruiden in wintertarwe

Om distels en haagwinde te bestrijden kunt u tot 10 dagen vóór het in de aar komen een bespuiting uitvoeren met 1 L/ha Tapir + 1 – 2 L/ha MCPA. Vóór de bestrijding van aardappelopslag kunt u het beste 0,6 L/ha Starane Top spuiten of 0,3 L/ha Starane Top toevoegen aan 1 L/ha Tapir. Starane Top dient met DRT 90% gespoten te worden. Om deze middelen goed te laten werken dient het groeizaam weer te zijn. Let er op dat de tarwe dit jaar heel snel ontwikkelt. Tapir, Primus en MCPA mogen na de bloei van het gewas ook toegepast worden. Wellicht zijn de omstandigheden dan beter.

Ziektebestrijding granen

De vroege percelen staan al in het vlaggenbladstadium. Voer een bespuiting uit voordat de aren tevoorschijn komen, maar wacht tot ook de secundaire vlaggenbladen goed te raken zijn. Er kan gespoten worden met 1 L/ha Elatus Era. Om Fusarium te voorkomen kan gekozen worden voor een gesplitste toepassing met 0,75 L/ha Elatus Era en bij de bloei een bespuiting met 0,8 L/ha Prosaro. Voeg 0,5 L/ha Velocity toe aan de ziektebespuiting. Velocity is een uitvloeier waarmee de opname van het middel sterk verbeterd wordt en daarmee ook de ziektebestrijding. Wanneer u graanhaantjes in het perceel aantreft kunt u 50 ml/ha Karate Zeon toevoegen aan de bespuiting. Controleer uw perceel ook op luizen. Elatus Era dient gespoten te worden met DRT 90%.

Overbemesting stikstof granen met KryptoN

Met het spuiten van 30 L/ha KryptoN wordt een volledige 3^e stikstofgift gegeven. Een voordeel van KryptoN is de efficiëntie waardoor er 30 kg zuivere stikstof wordt bespaard ten opzichte van 150 kg/ha KAS en de plant zal het bij deze droge omstandigheden eerder opnemen. Daarnaast zijn er geen strooibanen door een veel uniformere verdeling. De extreem lage zout-index zorgt ervoor dat er geen risico is op verbranding. KryptoN kan gemengd worden met Elatus Era.

Schimmelbestrijding in graszaad

Op dit moment is enkel nog Prosaro toegelaten voor de schimmelbestrijding in graszaad. Het advies is om 1 L/ha Prosaro net voor/ tijdens de bloei toe te passen. Prosaro mag maar één keer toegepast worden, maar dat is niet voldoende om het gewas schimmel-vrij te houden. Door 2 keer 3 L/ha Vitalosol Gold toe te passen, 10 – 14 dagen vóór de bloei en 10 – 14 dagen na de bloei, zorgt u er voor dat het gewas vitaler blijft en daardoor schimmels minder kans krijgen de plant aan te tasten.

Onkruidbestrijding wortelen

In de wortelen kunt u direct na zaai 1 – 1,5 L/ha Challenge + 2 L/ha Stomp + 0,15 L/ha Centium + 0,4 L/ha Grounded toepassen. Vervolgens kunt u vanaf het tweede echte blad een correctiebespuiting uitvoeren met 0,5 L/ha Challenge + 0,75 L/ha Boxer + 50 – 100 ml/ha Sencor. Challenge dient met DRT 95% en Stomp met DRT 90% gespoten te worden.

Onkruidbestrijding stamslabonen

Op kleigrond begint u vóór opkomst met 0,15 L/ha Centium + 0,75 L/ha Dual Gold + 0,4 L/ha Grounded. Omdat op zandgrond Dual Gold niet meer is toegelaten, kunt u daar starten met 0,15 L/ha Centium + 2 L/ha Fresco + 0,4 L/ha Grounded. Fresco is een nieuw toegelaten bodemherbicide in o.a. de teelt van stamslabonen. Na opkomst kan de onkruidbestrijding afgemaakt worden met 0,3 – 0,5 L/ha Basagran of 0,6 L/ha Corum + uitvloeier. Basagran mag maximaal 2 keer per seizoen toegepast worden met een maximum van 6 L/ha per teeltseizoen. Corum is sterker op meldesoorten, straatgras en papegaaiekruid. Corum mag 2 keer toegepast worden vanaf het eerste 3-bladstadium, met een maximum van 1,25 L/ha. Dual Gold dient gespoten te worden met DRT 90%.

Distelbestrijding in suikerbieten

Heeft u problemen met akkerdistel en/of akkermelkdistel, dan is het beter om Lontrel uit het LDS-systeem te laten en in één keer toe te passen als de distels voldoende ontwikkeld zijn. Gebruik hiervoor een dosering van 1,2 L/ha Lontrel + 1 L/ha Olie. Deze bespuiting kan ook pleksgewijs toegepast worden.

Bladvoeding met mangaan en borium essentieel in suikerbieten

We zien nu in de praktijk veel suikerbietenpercelen met mangaangebrek. Los dit op door 0,75 – 1 L/ha Mantrac Pro toe te voegen aan de onkruidbestrijding.

Suikerbieten zijn erg gevoelig voor een tekort aan borium. Vanaf het 6-bladstadium is het tijd om op zand- en zavelgronden, en tijdens deze droge omstandigheden ook op zwaardere gronden, 3 L/ha Bortrac 150 toe te voegen aan de onkruidbestrijding.

Luizen in suikerbieten

We komen in de suikerbietenpercelen veel luizen tegen, óók in de percelen die al een keer gespoten zijn tegen de luizen. Niet alleen de zwarte bonenluis, maar ook de groene perzikluis. Controleer u suikerbieten op luizen. Dit is eenvoudig te doen door in bijvoorbeeld een geer een tiental 'overbodige' planten eruit te trekken en te controleren op luizen.

Onkruidbestrijding aardappelen na opkomst

Veel aardappelen komen inmiddels boven. Na opkomst zijn de mogelijkheden voor een goede onkruidbestrijding vaak kleiner dan vóór opkomst. Mogelijkheden voor een na-opkomst bespuiting zijn: 30 – 40 g/ha Titus + 0,5 L/ha Aminosol, 75 – 125 ml/ha Sencor (let op gevoeligheid rassen), 50 – 150 ml/ha Basagran (let op bij zonnig weer), of een combinatie hiervan. Titus mag per seizoen 2 keer worden toegepast, maximaal 70 g/ha. Basagran mag slechts éénmaal per seizoen worden toegepast. Sencor mag na opkomst 2 keer worden toegepast, maximaal 0,75 L/ha per seizoen.

Luisbestrijding in pootaardappelen

Het regelmatig opschonen van uw perceel met middelen als Bariard, Calypso en Gazelle is van groot belang. De resultaten van onze luizenvangbakken kunnen hierbij ondersteunen.

U kunt de pyrethroïden zoals Sumicidin Super, Karate Zeon en Decis beter en langer laten werken door het toevoegen van 0,1% Prolong XP. Prolong XP is géén vervanger van minerale olie t.a.v. virusreductie, maar het geeft meer zekerheid. Voeg Prolong XP altijd als eerste aan de tankmix toe.

Bodemherbicide zaaiuien

Wanneer de grond vochtig is, kan vanaf het 1e pijpje net zichtbaar een bespuiting worden uitgevoerd met 0,5 – 1 L/ha Chloor IPC + 1 L/ha Wing P, eventueel aangevuld met 0,5 kg/ha Pyramin. Pyramin op lichte grond aanvullen tot 1,5 kg/ha en op zware grond tot 2 kg/ha. Dit in maximaal 3 keer toepassen. Wing P mag na opkomst 2 keer worden toegepast met een dosering van 1 – 2 L/ha. Stomp en Wing P dienen toegepast te worden met DRT 90%. De opgebruiktermijn van Pyramin is 30 juni 2020.

Bestel- en levertijden

Worden bij u 's morgens de bestellingen afgeleverd, bestel dan vóór 9.00 uur om het dezelfde dag nog in huis te hebben. Voor de middagroute geldt vóór 13.00 uur besteld, is dezelfde dag nog in huis.

Prijzen Vlamings graanpool bekend

De definitieve prijzen van onze graanpool zijn bekend. Dit is een middellange graanpool vanaf de oogst 2019 tot 30 april 2020. De prijzen zijn voor de bij oogst 2019 aan Vlamings geleverde tarwe en zijn exclusief BTW. Vultarwe wordt afgerekend op €165,- en voertarwe op €162,50 per ton.

Korte tips:

- Wij zien nog veel aardappel- en uienafvalhopen die nog niet afgedekt zijn!

Arjan de Feijter 06 – 5783 3663 **Jan** van Hassent 06 – 5364 9661 **Loek** Geluk 06 – 5121 7266
Lucien Laurijssse 06 – 5371 7537 **Marc** van der Bol 06 – 1052 0903 **Marijn** Nap 06 – 5175 4713