



5 september 2019

**Akkerbouw – veehouderij – tuinbouwgroenten**

### Loofdoding in aardappelen

Bij het doodspuiten van de aardappelen is het belangrijk dat er de eerste keer ook gedacht wordt aan de phytophthora bestrijding. Knolbescherming is in deze fase namelijk nog steeds belangrijk.

De toelating van de diverse loofdoodmiddelen op basis van diquat loopt af. Reglone en Reglone Bold mogen verkocht worden tot 4 november 2019. Reglone mag worden opgebruikt worden tot 4 november 2019, Reglone Bold mag worden opgebruikt tot 4 februari 2020.

Reglone mag maximaal 2 x per seizoen worden toegepast, maximaal 4 liter per hectare .  
 Reglone Bold mag maximaal 1 x per seizoen worden toegepast, maximaal 4 liter per hectare.  
 Voeg voor een betere werking 1 L/ha Olie 850 toe.

Bij droge grond is het af te raden om de aardappelen dood te spuiten met Reglone, omdat daardoor een grotere kans bestaat op naveleindrot. In plaats van Reglone kan dan gespoten worden met 1 l/ha Spotlight Plus. De toevoeging van 0,5 l/ha Companion Gold verbetert de werking van Spotlight Plus. Houdt er rekening mee dat Spotlight Plus uiterlijk 3 uur voor zonsondergang wordt toegepast. Let op: Spotlight Plus mag slechts eenmaal per seizoen worden toegepast. Na ongeveer 5 dagen is het gewas zover afgestorven dat Reglone veilig kan worden toegepast.

### Ziektebestrijding suikerbieten

Indien een vorige bespuiting tegen cercospora en andere bladvlekkenziekten meer dan 3 weken geleden is toegepast, kan weer een bespuiting uitgevoerd worden. Tot half oktober kan cercospora schade geven aan het gewas. Zorg daarom dat het bladapparaat beschermd is tot ten minste eind september.

Welk middel u nu het beste kunt gebruiken is afhankelijk van het middel wat u al toegepast heeft en de rooidatum. Voeg bij de bespuiting 0,5 L/ha Velocity toe. Velocity is een uitvloeier en hechter ineen die zorgt voor een betere verdeling op het blad, een betere indringing in het blad en een betere verdeling in het blad van de systemische fungiciden. Dit uit zich in een betere duurwerking van de fungiciden.

Middel:	Dosering ( ltr/ha):	Strobilurine:	Veiligheidstermijn:	DRT %
Retengo Plust	1	Ja	4 weken	75%
Sphere	(2x) 0,35	Ja	3 weken	75%
Opus Team	(2x) 1	Nee	46 dagen	90%
Spyrale	(2x) 1	Nee	4 weken	95%
Score / Borgi	(2x) 0,4	Nee	4 weken	75%
Difure Pro	(2x) 0,6	Nee	3 weken	75%

De uitverkoop termijn van Difure Pro was 31 juli 2019 en de opgebruiktermijn is 19 maart 2020. De uitverkoop termijn van Opus Team is 31 oktober 2019 en het opgebruiktermijn is 31 oktober 2020.

## Intrekking van de toelating van Betanal Maxxpro

De toelating van Betanal Maxxpro in de teelt van suikerbieten komt te vervallen. De aflevertermijn loopt tot 31 januari 2020 en de opgebruiktermijn bedraagt 1 juli 2020. Concreet betekent dit dat er voor de onkruidbestrijding in suikerbieten in 2020 nog steeds gekozen kan worden voor Betanal Maxxpro. Deze moet dan echter voor 31 januari bij u afgeleverd zijn. Overleg dit nu alvast met uw teeltadviseur.

## Bekalken op zandgrond

Kalk heeft enige tijd nodig om volledig tot werking te komen. Daarom is het in zijn algemeenheid aan te raden om kalk in het najaar te strooien. Verder geeft directe aanraking van kalk met ammoniumstikstof uit meststoffen ammoniak vervluchtiging. In het najaar speelt dit probleem niet. Een investering in kalk betaalt zich altijd uit! Vooral de wortelontwikkeling verloopt minder goed bij een lage pH. Zorg dus dat de pH hoog genoeg is.

Bekalk op basis van een grondonderzoek. Per tiende punt dient ongeveer 200 tot 250 neutraliserende waarde te worden toegevoegd. Dit komt neer op ongeveer 400 tot 500 kg droge kalk. Deze hebben namelijk een neutraliserende waarde van 50 tot 57%. Met sommige soorten kan eventueel extra magnesium worden toegediend.

Betacal Flow heeft een neutraliserende waarde van 17%. Let op dat fosfaat (8 kg per ton) voor 100% meetelt in de mestboekhouding. Een vloeibaar alternatief is Calhix Flow. Deze kalkmeststof bevat geen stikstof en fosfaat en heeft een neutraliserende waarde van 25%.

## Uitrijperiode drijfmest

Het uitrijden van drijfmest op bouwland is toegestaan van 1 februari tot 1 augustus. Langer uitrijden tot 15 september is toegestaan als uiterlijk 15 september van dit jaar een groenbemester wordt geteeld of in het najaar bloembollen worden geplant. Het uitrijden van drijfmest op grasland mag van 16 februari tot 1 september. Stikstofkunstmest mag van 1 februari tot en met 15 september gebruikt worden op gras- en bouwland.

	<i>Drijfmest</i>	<i>Stikstofkunstmest</i>	<i>Vaste mest zand</i>	<i>Vast mest klei</i>
<b>Grasland</b>	Tot 1 september	Tot 15 september	Tot 1 september	Tot 15 september
<b>Bouwland</b>	Tot 1 augustus	Tot 15 september	Tot 1 september	Tot 31 december
<b>Bouwland**</b>	Tot 15 september	Tot 15 september	Tot 1 september	Tot 31 december

\*\* met groenbemester, winterkoolzaad of bloembollen (najaar)

## Korte tips:

- Denk na het oogsten van uw gewas aan het invullen van de gewasbeschermingsmonitor. Deze dient ingevuld te zijn binnen 2 maanden na de oogst van het gewas. Zie [www.vlamings.nl](http://www.vlamings.nl) onder het kopje "documenten".
- De komende weken worden veel percelen ingezaaid met een groenbemester. Wanneer de groenbemester meetelt voor de GLB-vergroening, vergeet dan niet om direct na inzaai de juiste zaaidatum op 'Mijn RVO' in te vullen. Het invullen van de juiste zaaidatum is namelijk niet met terugwerkende kracht mogelijk.
- Om een keuze te maken voor de juiste groenbemester verwijzen we naar de Brochure groenbemers 2019 van begin juli 2019 of naar onze website.
- Door Europees besluit is de toelating van de actieve stof chloorprofam niet verlengd. De aflevertermijn van chloorbevattende kiemremmers is 8 juli 2020 en het opgebruik termijn is 8 oktober 2020.

**Arjan de Feijter** 06 – 5783 3663   **Jan van Hassent** 06 – 5364 9661   **Loek Geluk** 06 – 5121 7266  
**Lucien Laurijsse** 06 – 5371 7537   **Marc van der Bol** 06 – 1052 0903   **Marijn Nap** 06 – 5175 4713