



16 april 2020

Akkerbouw – veehouderij – tuinbouwgroenten

Onkruidbestrijding aardappelen

Als na het frezen de bedden bezakt zijn kunt u de bodemherbiciden toepassen. Het combineren van meerdere werkzame stoffen, in lagere doseringen, geeft een betere onkruidbestrijding. Melde-soorten, kleeftkuid, perzikkuid en zwaluwtong zijn de onkruiden die de meeste problemen geven in deze teelt. Zie onderstaande tabel voor de werking van de middelen op de probleem onkruiden.

Onkruiden	Middel
Kleeftkuid / Zwarte nachtschade	Boxer / Arcade
Melde-soorten	Challenge of Proman
Perzikkuid	Sencor / Arcade
Varkensgras / Zwaluwtong / Zwarte nachtschade	Centium

Een brede combinatie is 0,15 L/ha Centium + 1,5 – 2 L/ha Proman + 3 L/ha Arcade. Arcade kunt u ook vervangen door 0,4 L/ha Sencor + 3 L/ha Boxer. Door deze combinatie te spuiten worden de meest voorkomende onkruiden bestreden en kan ook gespoten worden in de sencorgevoelige rassen (behalve in Frieslanders). Verwacht u veel meldesoorten dan is de toepassing van 3 L/ha Arcade + 0,15 L/ha Centium + 1,5 L/ha Challenge een mogelijkheid. Voeg voor een betere en langere werking 0,4 L/ha Grounded toe. Boxer, Arcade en Challenge dienen toegepast te worden met DRT 90%. Let bij Sencor wel op rasbeperkingen. Deze lijst kunt u terug vinden in ons gewasbeschermingsboek op bladzijde 10 of in de Sencor app.

Onder de huidige omstandigheden zullen de bodemherbicide niet optimaal werken maar zorgen er wel voor dat corrigerende bespuitingen, na opkomst, beter zullen slagen.

Groei regulatie en ziektebestrijding wintertarwe

Als het weer omslaat en het weer eens vochtiger wordt, zijn de vroegste percelen wintertarwe snel toe aan de tweede groei regulatie. Dit stadium, de 2^{de} knoop voelbaar, is bereikt als het gewas tot de bovenkant van uw laars komt. Deze groei regulatie kan worden uitgevoerd met 0,5 L/ha CeCeCe + 0,25 L/ha Trimaxx. Voor een goede ziektebestrijding tegen Septoria, gele- en- bruine roest voegt u 0,75 L/ha Seguris toe. Op mangaan-gevoelig gronden kunt u daar nog 0,75 L/ha Mantrac Pro aan toevoegen. Seguris dient toegepast te worden met DRT 90%.

Onkruidbestrijding plantuien

Onder afgeharde omstandigheden kan 0,25 – 0,5 kg/ha Lentagran + 0,2 – 0,5 L/ha Bromotril + 0,12 – 0,18 L/ha Starane Top gespoten worden. Zorg er wel voor dat een waslaag op de plant zit. Met name de bestrijding van veelknopigen wordt door de toevoeging van Starane Top veel makkelijker. In totaal mag Lentagran 4 keer 0,25 – 0,5 kg/ha worden toegepast met een interval van 5 dagen. Bij Bromotril is dat 3 keer 0,25 – 0,5 L/ha met een totaal van 1 L/ha per hectare en een interval van 7 dagen. In totaal mag 0,3 l. Starane Top gespoten worden, verdeeld over 2 bespuitingen, met een interval van 14 dagen. Starane Top dient toegepast te worden met DRT 90%.

Wanneer de plantuien boven staan en de grond vochtig is kan een bespuiting uitgevoerd worden met 0,75 – 1 l. Chloor IPC + 0,5 – 0,75 l. Stomp + 1 l. Wing-P of 0,5 kg. Pyramin DF. Stomp op lichte grond aanvullen tot 2,5 l. en op zware grond tot 3,25 l. Pyramin DF aanvullen tot 2 kg. Wing-P maximaal 4 l. gebruiken. Stomp en Wing-P dienen toegepast worden met DRT 90%. Let op met Chloor in de buurt van bloeiende gewassen.

Onkruidbestrijding suikerbieten

Vanaf opkomst kunt u een bespuiting met 0,75 L/ha Betanal Maxxpro + 0,5 L/ha Goltix SC óf 0,5 L/ha BOGT uitvoeren. Wanneer de suikerbietenplantjes 2 echte blaadjes gaan vormen, kunt u de dosering gaan verhogen. Vanaf het 2-blad stadium kan gespoten worden met 1,25 L/ha Betanal Maxxpro + 1 L/ha Goltix SC óf 1 L/ha van de losse componenten. Momenteel komen we door de slechte structuur veel kamille, varkensgras en veelknopige onkruiden tegen. Deze onkruiden bestrijdt u door 0,25 L/ha Lontrel of 15 gr./ha Safari aan de mix toe te voegen.

Heeft u tweewassigheid in uw perceel suikerbieten, wacht dan niet met het bestrijden van aanwezige onkruiden. Doordat u de onkruiden in een klein stadium bestrijdt, kunt u later bij het opkomen van de tweede zending suikerbieten ook een bespuiting uitvoeren met een lage dosering.

Onkruidbestrijding zaaiuien

Direct na het zaaien van de uien of wanneer deze gekiemd zijn, kunt u een bespuiting uitvoeren met 0,75 – 1,25 L/ha Stomp + 0,4 L/ha Grounded. De middelen Wing-P, AZ-500, Pyramin DF en Dual Gold zijn niet toegelaten voor opkomst van het gewas. Vlak voor opkomst van de uien, is het aanwezige onkruid te bestrijden met 2 – 2,5 L/ha Klaverblad glyfosaat. Stomp dient toegepast te worden met DRT 90%.

Veel verschillende percelen zaaiuien krijgen te maken met tweewassigheid. Daarbij zullen sommige planten net boven komen en staan planten in het vlagblad-stadium. Dit bemoeilijkt de onkruidbestrijding, omdat over een té lange tijd geen contactherbicide-bespuiting uitgevoerd kan worden. Indien door de regen de grond voldoende vochtig is, kunt u wel een bespuiting uitvoeren met 0,5 L/ha Chloor IPC. Let op met Chloor IPC in de buurt van bloeiende gewassen.

AZ 500 dient gespoten te worden vanaf 100% opkomst en kan toegevoegd worden aan de bovengenoemde bespuitingen in een dosering van 0,2 L/ha.

Als je bij de kleinste plantjes het eerste pijpje boven de grond ziet kan onder afgeharde omstandigheden een bespuiting met 0,25 – 0,5 kg/ha Lentagran + 0,15 L/ha Bromotril + 0,12 L/ha Starane Top uitgevoerd worden. Zorg er wel voor dat er een waslaag op de plant zit. Met name de bestrijding van veelknopigen wordt door de toevoeging van Starane Top veel makkelijker. In totaal mag Lentagran 4 keer 0,25 – 0,5 kg/ha worden toegepast met een interval van 5 dagen. Bij Bromotril is dat 3 keer 0,25 – 0,5 L/ha, met een totaal van 1 L/ha per hectare en een interval van 7 dagen. In totaal mag 0,3 L/ha Starane Top gespoten worden, verdeeld over 2 bespuitingen, met een interval van 14 dagen. Starane Top dient toegepast te worden met DRT 90%.

Wanneer de grond vochtig is, kan vanaf het 1e pijpje net zichtbaar een bespuiting worden uitgevoerd met 0,5 – 1 L/ha Chloor IPC + 1 L/ha Wing P, eventueel aangevuld met 0,5 kg/ha Pyramin. Pyramin op lichte grond aanvullen tot 1,5 kg/ha en op zware grond tot 2 kg/ha. Dit in maximaal 3 keer toepassen. Wing P mag na opkomst 2 keer worden toegepast met een dosering van 1 – 2 L/ha Stomp en Wing P dienen toegepast te worden met DRT 90%.

Vlamings waarschuwings-WhatsApp

Dit seizoen kunt u weer gebruik maken van onze waarschuwings-WhatsApp voor de gewassen aardappelen en uien. U kunt uzelf aanmelden voor deze WhatsApp service. U ontvangt dan enkele keren per seizoen een berichtje wanneer iets bijzonders in de teelt gaande is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om, in het geval van uien, de eerste gevonden meeldauw of trips. U kunt uzelf aanmelden door “Aardappelen AAN” en/ of “Uien AAN” te appen naar het nummer: 0167 566 350. U ontvangt dan persoonlijk een appje van de “Vlamings-telefoon”. Het is geen WhatsApp groep.

Korte tips:

- Vanwege de Corona-maatregelen hebben wij besloten om dit jaar geen open dag op het Innovatieveld te organiseren.

Arjan de Feijter 06 – 5783 3663 **Jan van Hassent** 06 – 5364 9661 **Loek Geluk** 06 – 5121 7266
Lucien Laurijsse 06 – 5371 7537 **Marc van der Bol** 06 – 1052 0903 **Marijn Nap** 06 – 5175 4713