

AgroTips

4 mei 2021

Onkruidbestrijding aardappelen

Als na het frezen de bedden bezakt zijn kunt u de bodemherbiciden toepassen. Het combineren van meerdere werkzame stoffen, in lagere doseringen, geeft een goede en brede onkruidbestrijding. Melde-soorten, kleefkruid, perzikkruid en zwaluwtong zijn de onkruiden die de meeste problemen geven in deze teelt. Zie onderstaande tabel voor de werking van de middelen op de probleem onkruiden.

Onkruiden	Middel
Kleefkruid / Zwarte nachtschade	Boxer / Arcade
Melde-soorten	Challenge, Gofor of Proman
Perzikkruid	Sencor / Arcade
Varkensgras / Zwaluwtong / Zwarte nachtschade	Centium

Een brede combinatie is 0,15 L/ha Centium + 1,5 – 2 L/ha Proman + 3 L/ha Arcade. Arcade kunt u ook vervangen door 0,4 L/ha Sencor + 3 L/ha Boxer. Door deze combinatie te spuiten worden de meest voorkomende onkruiden bestreden en kan ook gespoten worden in de sencorgevoelige rassen (behalve in Frieslanders). Verwacht u veel meldesoorten dan is de toepassing van 3 L/ha Arcade + 0,15 L/ha Centium + 1,5 L/ha Challenge een mogelijkheid. Voeg voor een betere en langere werking 0,4 L/ha Grounded toe. Boxer, Arcade en Challenge dienen toegepast te worden met DRT 90%. Let bij Sencor wel op rasbeperkingen. Deze lijst kunt u terug vinden in ons gewasbeschermingsboek op bladzijde 13.

Nieuw is het middel Gofor. Dit middel kan in de mix ingezet worden i.p.v. Challenge of Proman. Het nadeel van dit product is dat Gofor toegepast dient te worden met DRT 95% langs watervoerende sloten.

Onkruidbestrijding zaaiuien

Voor de veiligheid is het aan te raden om Wing P pas in te zetten vanaf begin eerste pijpje. Vanaf dat moment heeft de uienplant minimaal 3 wortels gemaakt. Vanaf dit stadium kunt u 0,5 – 1 L/ha Wing P toepassen én is het mogelijk om contactherbiciden in te zetten. Stomp en Wing P dienen toegepast te worden met DRT 90%.

Als je bij de kleinste plantjes het eerste pijpje boven de grond ziet kan onder afgeharde omstandigheden een bespuiting met 0,25 – 0,5 kg/ha Lentagran + 0,15 L/ha Bromotril + 0,12 L/ha Starane Top uitgevoerd worden. Zorg er wel voor dat er een waslaag op de plant zit. Met name de bestrijding van veelknopigen wordt door de toevoeging van Starane Top veel makkelijker. In totaal mag Lentagran 4 keer 0,25 – 0,5 kg/ha worden toegepast met een interval van 5 dagen. Bij Bromotril is dat 3 keer 0,15 – 0,5 L/ha, met een totaal van 1 L/ha per hectare en een interval van 7 dagen. In totaal mag 0,3 L/ha Starane Top gespoten worden, verdeeld over 2 bespuitingen, met een interval van 14 dagen. Starane Top dient toegepast te worden met DRT 90%.

Bestel- en levertijden

Worden bij u 's morgens de bestellingen afgeleverd, bestel dan vóór 9.00 uur om het dezelfde dag nog in huis te hebben. Voor de middagroute geldt vóór 13.00 uur besteld, is dezelfde dag nog in huis.

Bladvoeding plantuïen

Om uw plantuïen gezond te houden en de groei te versnellen, kunt u ze een handje helpen met bladvoeding. Dit doet u door wekelijks 2,5 – 3 L/ha Total Care + 0,5 L/ha Mantrac te spuiten. Om de week kunt u daarbij 1,5 – 2 L/ha Hydromag toevoegen en de volgende bespuiting 4 – 5 L/ha Kali TS. Bij mangaangebrek vallen de pijpen alle kanten op. Magnesiumgebrek uit zich in een vaal gewas. Bij snelle bladontwikkeling en bij droogte is de kans op deze gebreken erg groot. Deze producten kunnen gemengd worden met Mancozeb-bevattende producten en Fandango.

Onkruidbestrijding suikerbieten

De meeste suikerbieten zijn het kiemblad-stadium voorbij. Vanaf het 2-blad stadium kan gespoten worden met 1 L/ha BOGT (Astrix, Olie, Goltix en Trammat) óf 1 L/ha Betanal Tandem + 1 L/ha Goltix SC + 1 L/ha (plant)olie uitvoeren. Bij aanwezigheid van kamille, varkensgras en veelknopige onkruiden voegt u 0,25 L/ha Lontrel of 15 g/ha Safari aan de mix toe. Vanaf 2 echte blaadjes is het toevoegen van 100 g/ha Safari Duo Active een betere keuze dan Safari. Safari Duo Active dient toegepast te worden met DRT 90%.

Onkruidbestrijding knolselderij en wortelen

Voor onkruidbestrijding in knolselderij geldt het volgende advies: 0,15 L/ha Centium + 2,5 – 3 L/ha Boxer + 1 – 1,5 L/ha Stomp + 0,6 – 1 L/ha Challenge + 0,4 L/ha Grounded.

In de wortelen kunt u direct na zaai 1 – 1,5 L/ha Challenge + 1,5 – 2 L/ha Stomp + 0,15 L/ha Centium + 0,4 L/ha Grounded toepassen. Vervolgens kunt u vanaf het tweede echte blad een correctiebespuiting uitvoeren met 0,5 L/ha Challenge + 0,75 L/ha Boxer + 50 – 100 ml/ha Sencor. Challenge dient met DRT 95% en Stomp met DRT 90% gespoten te worden.

Groene oplossingen in de praktijk

Tercol – betere weerbaarheid tegen Ritnaalden, uïenvlieg en bonenvlieg

Vraatschade door ritnaalden is in o.a. aardappelen en uïen een probleem aan het worden. Daarnaast zijn door het verdwijnen van de zaadcoating de larven van de uïenvlieg en bonenvlieg een toenemend probleem in uïen en bonen.

Tercol zorgt ervoor dat er een geurbarrière rond de plant opgebouwd wordt. De geur van Tercol zorgt ervoor dat de ritnaald, uïenvlieg of bonenvlieg misleid wordt en de weg naar knol of plant niet meer kan vinden. De basis toepassing kan met Tercol Granulaat in de plant/zaai veur toegepast worden. Later in het seizoen kan Tercol Vloeibaar vollevelds toegepast worden voor of in de regen óf voorafgaand aan het beregenen.

Naast het veroorzaken / creëren van een geurbarrière, ondersteunt Tercol de opbouw van het natuurlijk herstellend vermogen en de weerbaarheid bij deze abiotische stress van het gewas. Hierdoor kan op een indirecte wijze de overlast en schade van de insecten beheersbaar worden.

Korte tips:

- De open dag op ons Innovatieveld in Steenberg is gepland op dinsdag **22 juni 2021**. De uitnodiging volgt te zijner tijd.
- Wij zien nog veel aardappel- en uïenafvalhopen die nog niet afgedekt zijn!
- Let op! U heeft nog t/m 15 mei om de Gecombineerde Opgave in te vullen.

Arjan de Feijter 06 – 5783 3663 Jan van Hassent 06 – 5364 9661 Loek Geluk 06 – 5121 7266
Lucien Laurijsse 06 – 5371 7537 Marc van der Bol 06 – 1052 0903 Marijn Nap 06 – 5175 4713

