



Bladvoedingsschema Kers

			Schuivende knop	Groene knop	Roze knop	Bloei	Afbloei	Val bloemblad	Vrucht zetting	Vrucht groei	Oogstrijpe vruchten	na-oogst, voor bladval
Bortrac 150	borium				1 l/ha				1 l/ha		1 l/ha	1 l/ha
ACS-Koper 350	koper		2 l/ha	0,5 l/ha							3 l/ha	
Ferleaf 100	ijzer	1							0,75 l/ha			
Mantrac Pro	mangaan					4 x 0,5 l/ha					1 l/ha	
Molytrac 250	molybdeen	6										
Zintrac 700	zink				1 l/ha						1 l/ha	
Hydromag 500	magnesium								2 x 4 l/ha			
Caltrac ZB	calcium	2						1 à 2 x 5 l/ha				
Thiotrac	zwavel	6										
KryptoN	stikstof	3				30 l/ha			30 l/ha		15 l/ha	
Seniphos	fosfor								5 l/ha			
Agripotash	kali								5 l/ha			
Aminosol	aminozuren	4					2 x 7,5 l/ha				2 l/ha	2 l/ha
Stimplex	celdeling	5			2 l/ha	2 l/ha			2 x 2 l/ha			

- 1 Bij zichtbare gebrekssymptomen of gevoelige percelen.
- 2 Binnen 4 weken voor oogst niet toepassen ivm mogelijk zichtbaar residu.
- 3 Geen ureum. Bodemtoepassing beperken met 1/3.
- 4 Beperking van de rui. Einde bloei + na 10 dagen herhalen.
- 5 Bevordering van de celdeling en groei.
- 6 Geen bemesting noodzakelijk