



Studiemiddag druiventeelt



Joost Nijssen
Crop Advisor Fruit





Inhoudsopgave

// Fungiciden

// Luna Sensation

// Insecticiden

// Batavia

// Sivanto Prime

// Groene gewasbescherming

// Serenade

// Flipper



Luna Sensation in de druiventeelt

Toepassings gebied	Werkzaam tegen	Dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval	Veiligheids termijn in dagen
Druif (OT)	Echte meeldauw	0,2 L/ha	2	14	14

Merksnaam	Werkzame stof	Gehalte
Luna Sensation	fluopyram	250 gram/ L
	trifloxystrobin	250 gram/ L



Mogelijkheden met Luna Sensation in druif



Overige toepassingsvoorwaarden:

Toepassing in de teelt van druif is uitsluitend toegestaan tot BBCH 73 (tot de druiven zo groot zijn als grutten en de trossen beginnen te hangen)



Insecten- bestrijding




SIVANTO[®]

**Mogelijkheden met
Sivanto Prime**



Werkingspectrum in de fruitteelt





Sivanto Prime



Toepassings-gebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoets op	Dosering middel per toepassing	Max dosering middel per toepassing	Max aantal toepassingen per 12 of 24 maanden	Max aantal liter middel per ha. per 12 of 24 maanden	Minimum interval	Veiligheids-termijn in dagen
Druif (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling vanaf bloei volledig ontwikkeld of:	Cicaden	0,5 L/ha	0,5 L/ha	1 x per 12 maanden	0,5 L/ha per 12 maanden	-	14
Druif (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling vanaf begin bloei	Druivencicade	0,24 L/ha	0,24 L/ha	1 x per 12 maanden	0,5 L/ha per 12 maanden	-	14

// Om het grondwater te beschermen mag dit product in onbedekte teelten niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden



Advies Sivanto Prime



- // Normaal watervolume (250 l/ha).
- // Snelle aanvangswerking.
- // Zeer goede ervaringen op roze appelluis, groene appelwants en kevers mede door zowel contact als systemische werking.
- // Altijd eerst een proefbespuiting in druif i.v.m. de diversiteit van de rassen



BATAVIA[®]

Mogelijkheden met Batavia



Batavia

Toepassings- gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering	Maximale dosering	Aantal toepas- singen	Interval
Druif (onbedekte teelt)	Na de bloei	Bladluis	0,075%	0,75 l/ha	2 per 12 mnd	14 dagen



Batavia



// Toelating fruitteelt verleend september 2018

	Batavia	Movento
Formulering	SC	OD
Werkzame stof	spirotetramat	spirotetramat
Gehalte	100 gr/l	150 gr/l
Dosering	0,075% met een maximale dosering van 0,75 L/ha	0,05% met een maximale dosering van 0,6 L/ha



Advies bij toepassing Batavia



- // Toepassen onder groeizame omstandigheden.
- // Voldoende water gebruiken.
- // Batavia niet gemengd toepassen met fungiciden, insecticiden en bladmeststoffen.
- // Geen aanvullende driftreducerende maatregelen.
- // Werkingsspectrum gelijk aan Movento.
- // 2 toepassingen inzetten met een interval van 14 dagen.



Vergroening in de druiventeelt

Keuze van biologische oplossingen in de fruitteelt/ druiventeelt






Serenade

Wat zit er in de fles?



Drie klassen van “biologische chemie”
(fermentatie producten)



... en levende sporen van *Bacillus amyloliquefaciens*


Bestrijding meeldauw in rode bes i.s.m. Vlamings



Doelstelling:	Bestrijding meeldauw in rode bes i.s.m. Vlamings
Type proef:	Doorspuitschema
Gewas:	Junifer (tijdelijke overkapping)
Watervolume:	400 L/ha
Aantal bespuitingen:	4 toepassingen (11/05 tot 02/06)
Interval:	Wekelijks
Locatie:	Berry Brothers



Meeldauwbestrijding in rode bes





Flipper



- // Vetzuren kaliumzouten (plantaardig).
- // Afkomstig uit de olijvenindustrie.
- // 100% plantaardige oorsprong.
- // EW formulering (olie in water).
- // 480 g actieve stof per l.
- // Vriendelijk profiel voor nuttigen
- // Flipper/ Flipper Plus
- // Inputlijst SKAL
- // **Werking uitsluitend door contact!**





Luisbestrijding opkweek bessen

Luis: Melkdistelluis en Hennepneteltluis

- // Bespuitingen met koud en donker weer vielen tegen
- // Bespuitingen met zonnig weer goed
- // Luizen in ingekrulde bladeren moeilijk te raken en beperkte effecten bespuitingen





Advies bij toepassing Flipper



- // Voor een optimale bestrijding moet de behandeling worden uitgevoerd zodra de plaag wordt **waargenomen**.
- // De te bestrijden insecten en mijten dienen goed **geraakt** te worden.
- // Het beste bestrijdingsniveau zal worden bereikt tijdens **zonnige, snel drogende omstandigheden**.


- Minimum interval aanhouden van 7 dagen.
- Maximaal 3 toepassingen achter elkaar uitvoeren.
- Niet mengen.
- Geen uitvloeiers, hulpstoffen of bladmeststoffen toevoegen.
- Dosering: 1%.



Aandachtspunten bij gebruik Flipper



Water pH > 7



Opslag > 10°C



Water < 16,8° dH



*Bedankt
voor de
/////////
aandacht!*